


Zgodnje prepoznavanje grizenja repov z opazovanjem prašičev

Zgodnje prepoznavanje znakov vpliva na manjšo pojavnost grizenja repov, manjše stroške zdravljenja, boljšo produktivnost ter nenazadnje boljše počutje živali in zadovoljstvo rejca.

Zato da opazi, da je s prašiči nekaj narobe, si mora rejec/oskrbnik vzeti čas tudi za opazovanje. Potrebno je opazovati tako skupino in kot vsako žival individualno. Na ta način lahko pridobimo širšo sliko o dogajanju v hlevu. Živali lahko opazujemo med opravljanjem ostalih rejskih opravil. Občasno pa je priporočljivo ogled reje opraviti v nasprotni smeri delovne rutine (slika 1). Ko opazujemo živali, so nam lahko v pomoč tudi naslednje oporne točke:

1. Kaj vidim? Kaj se dogaja?
2. Zakaj se je to zgodilo?
3. Kaj to pomeni?



Slika 1: Opazovanje prašičev uvrstimo v delovni urnik

Na podlagi videnega se odločimo ali je potrebno ukrepati in kako bomo ukrepali. V vsakem primeru se moramo zavedati, da je opazovanje živali nujno, če želimo težave odkriti pravočasno. Spremembe na repu prikazujemo na slikah 2 do 5.



Slika 2: Prašiči z nepoškodovanimi repi



Slika 3: Prašiča na sredini fotografije je potrebno opazovati, če se je pojavilo grizenje repov



Slika 4: Prašič, na sredini, ima spuščeni spodvit rep, kar se pojavi 1 dan pred grizenjem repov



Slika 5: Prašič, v boksu na levi strani, ima spuščeni spodvit rep

Na sliki 6 so vidne resne poškodbe, kar pomeni, da rejec ni bil uspešen pri odkrivanju/preprečevanju grizenja repov. Takoj ko opazimo spremembe moramo iz skupine odstraniti napadalca in žrtev ter preveriti možne vzroke, kot so krma in voda, ventilacija, gostota naselitve, dostopnost materiala za zaposlitev.



Slika 6: Posledice grizenja repov

Prpravili:
Janja Urankar, univ. dipl. inž. zoot.
doc. dr. Špela Malovrh