


Mere uspešnosti oplojevanja



Milena KOVAČ



Mere uspešnosti oplojevanja

Število dogodkov

(pripustov, prasitev, pregonitev, izločitev po pripustu, abortusov ...)

Deleži dogodkov

Dobe od pripusta do dogodka

Velikost gnezda




Sodelujoči:

Svinja

Merjasec

Rejec




Oplojevanje

- Naravni pripust
- Merjasec oplodi, rejec nadzoruje in zapiše




- Osemenjevanje
 - rejec osemi in zapiše,
 - merjasec “opazuje” (spodbuja privolitveni refleks)
 - “~~umetno~~” osemenjevanje – slab prizvok




Pojav bukanja svinje




- Mladice – prvič ob spolni zrelosti
- Po bukanju (brez pripusta): vsakih ~21dni
- Po neuspešnem pripustu:
 - Redna pregonitev – po ~21 dni (ali večkrat 21)
 - Izredna pregonitev – na 24.-38. dan po pripustu
- Po odstavitvi (s trdom rejca): ~5 dni
- V laktaciji:
 - Daljša laktacija, razbremenitev svinje
- **Nikakor ne kadarkoli in le izjemoma izven običajnih terminov**




Pojav bukanja po odstavitvi





Starost mladic ob prvem pripustu






Pletren

Dogodki po pripustu

(Od pripusta do prvega dogodka)

Pripusti



Prasitev !

Izločitve po pripustu !

Pregonitev

(tudi vzroka: pregonitve in zvriganje)

Abortusi


(in ponovno pripuščena)


(če se le da, svinje z abortusom izločimo)




Duroc


Število dogodkov, deleži in dobe







Delež prasitev







Delež pregonitev





Doba od pripusta do pregonitve






Pregonitve


Delež pregonitev:

- Priprava na pripust (kondicija svinje)
- Izvedba pripusta, higiena ob pripustu
- Uspešnost odkrivanja pregonitev
- Kriteriji za izločanje
 - 82 % in več uspešno pripuščene ob prvem pripustu
 - ? še ena priložnost ob pravočasnem pripustu
 - ? pri prvesnicah nekaj več tolerance



Doba od pripusta do pregonitve:

- Uspešnost odkrivanja pregonitev
- Vzrok (neuspešna oploditev, neuspešna ugnezditev, izumrtje zarodkov)
- ...



Krmni dnevi na pripust

Stroški po pripustu:

Število krmnih dni po vseh pripustih =

\sum Brejost +

+ \sum Doba od pripusta do pregonitve +


+ \sum Doba od pripusta do izločitve + ...

Prihodki po pripustu:

Število (živo)rojenih pujskov

Stroški, ki niso všteti:

Laktacija, interim obdobje, izločene pred pripustom



Uporabnost mer oplojevanja

- **Prednosti**
 - proučujemo lahko vplive, ki nastopijo šele ob pripustu ali kasneje (merjasec, o semenjevalec, sezona pripusta ...)
 - oplojevanje je zelo pomembno opravilo (za velikost gnezda, število gnezd na svinjo letno, za načrtovanje ...)
- **Slabosti**
 - Spremljamo samo dogodke po pripustu ali malo pred njim
 - Praviloma manj problemov po oplojevanju
 - Več napak narejenih pred pripustom
 - Ne spremljamo celotnega reprodukcijskega ciklusa
 - Ni vključenih pred pripustom izločenih svinj